

Evacuation of Retained Product of Conception (ERPOC)

Download ERPOC consent [[EN](#) | [BM](#)]

1. The intended benefits:

- To evacuate the uterine cavity of any retained products of conception as in the case of incomplete miscarriage, early embryonic/fetal demise or anembryonic pregnancy

2. Possible serious risks:

- Uterine perforation
- Cervical trauma or bleeding
- Intra-abdominal trauma
- Intrauterine adhesions
- Bleeding

3. Possible frequently occurring risks:

- Infection - approximately in 3 to 5% of cases
- Incomplete evacuation

4. Any extra emergency procedures which may become necessary during the procedure

- Blood transfusion
- Repair to bladder, bowel, major blood vessel or uterus
- Laparoscopy or laparotomy to identify / confirm and / or repair any damage to bladder, bowel, major blood vessel or uterus
- Return to theatre for repeat evacuation

Serious complications such as these occur (in general) in approximately 2% of cases.

Women who have pre-existing medical conditions must understand that the quoted risks for both serious

and frequent complications may be increased.

All operations carry some risk of death. The risk in an operation such as this is estimated as 1 in 200000

procedures.

I have also discussed the benefits and risks of any available alternative treatments including the option of no treatment.

1. Kebaikan yang diinginkan: (pilih yang berkenaan)

- Untuk mengeluarkan baki tisu hasil kandungan seperti mana didapati dalam kes 'incomplete miscarriage', 'early embryonic/fetal demise' or 'anembryonic pregnancy'

2. Risiko serius yang mungkin terjadi:

- Tertembus dinding rahim
- Trauma atau pendarahan dari pangkal rahim
- Trauma tisu/organ dalam tubuh
- Mengakibatkan kelekatan tisu dalam rahim / dinding rahim (intrauterine adhesions)
- Pendarahan berlebihan

3. Risiko yang mungkin berlaku pada kadar agak kerap:

- Jangkitan - berlaku dalam hampir 3 hingga 5% kes
- Pengosongan kandungan rahim yang tidak sepenuhnya

4. Prosedur tambahan (kecemasan) yang mungkin harus dilakukan semasa pembedahan:

- Transfusi darah
- Membaik-pulih kerosakan kepada pundi kencing, usus, saluran darah utama atau rahim
- Laparoscopy or laparotomy untuk mengenal-pasti atau membaik-pulih kerosakan kepada pundi kencing, usus, saluran darah utama atau rahim
- Kembali ke dewan bedah untuk prosedur pengosongan kandungan rahim sekali lagi

Komplikasi serius seperti yang telah tertera berlaku secara amnya pada kadar lebih kurang 2% kes.

Wanita yang sudah sememangnya menghadapi penyakit lain harus faham bahawa risiko yang kerap serta

serius seperti yang telah tertera mungkin berlaku pada kadar yang lebih tinggi.

Semua pembedahan boleh membawa risiko kematian. Risiko untuk pembedahan seperti ini adalah dijangka

1 dalam 200000 prosedur

Saya juga telah membincangkan kebaikan serta kelemahan rawatan alternatif termasuk pilihan untuk tiada

rawatan.