

## **Vaginal birth after caesarean vs repeat caesarean section (Bahasa Melayu)**

Kauseling versi bahasa melayu.

Kaedah kelahiran biasa selepas pembedahan caeserean VS pembedahan caeserean ulangan.

A/N: 1 parut 2 tahun lepas untuk kedudukan songsang.

- Peluang untuk percubaan lahir biasa : 3 daripada 4 wanita berjaya.
- Risiko : Parut terbuka
- 7 dalam 1000 wanita mengalami risiko kelemahan parut atau parut terbuka.
- bersalin biasa 1% risiko lebih tinggi berbanding bedah ulangan : pemindahan darah atau jangkitan pada rahim.
- mengurang masalah pernafasan.
- risiko masalah pernafasan untuk bersalin biasa adalah 2-3 dalam 100 pesakit berbanding dengan pembedahan dimana risiko lebih tinggi sekitar 3-4 dalam 100 pesakit.
- dalam kes-kes tertentu seperti jangkaan saiz bayi besar and kedudukan bayi tiadak normal, adalah lebih sesuai untuk kaedah pembedahan ulangan.
- kebaikan pembedahan ulangan:
  - tiada risiko parut rahim terbuka
- Risiko pembedahan ulangan:
  - kecederaan pada pundi and saluran air kencing, usus ( 1-5 dalam 1000 pesakit)
  - uri melekat pada parut rahim (3% untuk pembedahan pertama, 11% untuk kedua)
  - pendarahan yang mengancam nyawa ibu.
  - menghad saiz keluarga.
  - jangkitan kuman.
- Risiko pembedahan ulangan untuk bayi:
  - masalah pernafasan ( 3-4% berbanding dengan bayi yang dilahirkan secara biasa)
  - Kecederaan kepada bayi semasa pembedahan.

## **O&G @ SGH**

O&G @ SGH is the resource website of the Obstetrics & Gynaecology department of Sarawak General Hospital, Kuching, created to provide resources, guidelines and information to junior doctors practicing in Sarawak.  
<http://www.sgh-og.com>

---

- pemeriksaan lanjut seperti pemeriksaan fizikal dan pangkal rahim, imbasan ultrasound untuk menentukan kedudukan, saiz dan kesihatan bayi akan dibuat kepada ibu mengandung yang mencecah tarikh jangkaan bersalin.

- Kaedah sweep & stretch : Buka pangkal rahim diregangkan dengan jari jika terdapat bukaan pada pangkal rahim.

- Kaedah memulakan proses kelahiran:

- Sweep & stretch (jika pangkal rahim buka)
- Prostaglandin (jika pangkal rahim tutup)
- memecah air ketumban diikuti infusi oxytocin

- Risiko parut terbuka dengan prostaglandin 12 dalam 1000 wanita, dengan oxytocin 8 dalam 1000 wanita.